

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

НОРМОБАКТ JUNIOR

**Вкус шоколадки
и животик в порядке!**



- Восстанавливает равновесие микрофлоры кишечника после антибактериальной терапии
- Продлевает жизнь "полезных" бактерий, корректирует дисбактериоз
- Устраняет пищевую аллергию в комплексной терапии
- Укрепляет иммунитет
- Удобная форма выпуска – 1-2 медвежонка в сутки. Детям с 3-х лет. Курс лечения 10-14 дней

Медвежата
со вкусом белого
шоколада
таблетки

**ПРОБИОТИК + ПРЕБИОТИК
КАК ЧАСЫ РАБОТАЕТ ЖИВОТИК**

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)
АО «Химфарм», г.Шымкент, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ул. Рашидова б/н, тел./факс: 8 7252 561342, 560882, e-mail: standart@santo.kz

Человек и Лекарство – Казахстан

Научно-практический
тематический журнал

10(14) 2012

Если детское сердце
болит...

Рекомендации
Американской Академии
Педиатрии (ААП)

Клуб педиатра –
Орфанные заболевания:
диагностика и лечение

Проблема кожного
зуда при атопическом
дерматите у детей

Современные аспекты
профилактики вирусного
гепатита В



№10 (14), 2012

Педиатрия

Человек и Лекарство – Казахстан

Боботик

симетикон

Чтобы не болел
ЖИВОТИК



8
капель
после
еды

Показания:

- усиленное газообразование и накопление газов
- диспепсия
- в качестве пеногасителя при острых отравлениях моющими средствами

Способ применения и дозы: применяется после еды и перед сном:

дети от 28 дня жизни до 2 лет по 8 капель 4 раза в сутки,
дети от 2 до 6 лет по 14 капель 4 раза в сутки,
дети старше 6 лет и взрослые по 16 капель 4 раза в сутки

Противопоказания:

повышенная чувствительность к симетикону и /или другим компонентам препарата, кишечная непроходимость, обструктивные заболевания ЖКТ

Условия отпуска из аптек: Без рецепта

Производитель: Медана Фарма АО 98-200 Серадз, ул. В. Локетка 10, Польша

Перед применением и назначением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5-№015656 от 15.02.2010 Разрешение №3306 от 17.02.2012 г.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)
Представительство ФЗ "Польфарма" СА в РК,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби 15, бизнес-центр «Нурлы Тау» 4Б, офис 1201. тел./факс: +7 (727) 3111-289



ЖҰМЫСТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРЕДІ

Тамақтану режимі бұзылуының салдарын жояды

Қолданар алдында нұсқаулықпен мұқият таныс болыңыз.



▲ Іштің кебуі ▲ Жайсыздық ▲ Диарея



▲ Вzdутие ▲ Дискомфорт ▲ Диарея

НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ

Устраняет последствия нарушенного режима питания

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- ▲ Іштің кебуі
- ▲ Жайсыздық
- ▲ Диарея
- ▲ Вzdутие
- ▲ Дискомфорт
- ▲ Диарея
- ▲ Климат ауыстыру
- ▲ Тамақтану режимі бұзылуы
- ▲ Антибиотиктер қабылдау
- ▲ Смена климата
- ▲ Нарушение режима питания
- ▲ Прием антибиотиков

Саудалық атауы
Линекс®

Қолданылуы
- антибиотиктерді, сульфониламидтерді, химиотерапиялық препараттарды, сәулемен емдеуді қабылдау кезінде және әртүрлі емдеуден кейінгі дисбактериозды емдеу және алдын алуда
- жедел ішек жұқпасында (бактериялық және вирустық этиологиядағы) кешенді ем құрамында
- дәреттің бұзылуы: созылмалы іш қатуы, диарея (3 жасқа дейінгі балаларда тек дәрігердің тағайындауы бойынша)
- жолаушылар диареясы
- тамақтану, ем-дәм тәртібі бұзылғандағы диспептикалық синдром (кекіру, жүрек айнуы, құсу, метеоризм, іштің ауырулары)

Қолдану тәсілі және дозалары
Капсулаларды тамақтану кезінде аз мөлшердегі сумен қабылдайды. Егер бала бүтін капсуланы жұта алмаса, оны ашып ішіндегіні аздаған мөлшердегі сұйықтықпен (шай, шырын, қант қосылған су) араластырып беру керек.
Өмірінің алғашқы күнінен бастап 2 жасқа дейінгі балаларға күніне 3 рет тамақтан кейін 1 капсуладан аздаған мөлшердегі сумен беру ұсынылады.
2-ден 12 жасқа дейінгі балаларға күніне 3 рет тамақтан кейін 1 немесе 2 капсуладан аздаған мөлшердегі сумен ішу ұсынылады.
Ересектер мен 12 жастан асқан балаларға күніне 3 рет тамақтан кейін 2 капсуладан аздаған мөлшердегі сумен ішу ұсынылады.
Дисбактериоздағы емдеу курсы 10-12 күнді құрайды. Емдеу ұзақтығы дисбактериоздың ершу себебіне және организмнің дербес ерекшеліктеріне байланысты болады.
Жедел ішек жұқпасындағы, диарея және диспептикалық синдромдағы емдеу курсы 5-7 күнді құрайды.
Егер емделушінің жағдайы капсуланы екі күн қабылдағаннан кейін жақсармаса, дәрігерге көріну қажет.

Қолдануға болмайтын жағдайлар
- препараттың кез-келген компонентіне жоғары сезімталдық (көтере алмаушылық)
- сүт өнімдерін көтере алмаушылық

Жүктілік және лактация
Жүктілік және лактация уақытында дерілік затты пайдалануға қарсылық жоқ.
Алайда препаратты тағайындау туралы шешімді дәрігер қабылдайды.

Дәріханадан босатылу шарттары
Рецептісіз

23.05.2011 ж. ҚР-ДЗ-5-№004015
28.06.2012 ж. №3544 рұқсаттама

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасы бойынша шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы
«Новартис Фарма Сервисс АГ» филиалы 050059, Алматы қ., Жамбаев к-сі, 155А-үй.

Қолданар алдында нұсқаулықпен мұқият таныс болыңыз.

Торговое название
Линекс®

Показания к применению
- лечение и профилактика дисбактериоза после лечения антибиотиками, сульфаниламидами, химиотерапевтическими препаратами, лучевой терапии
- острые кишечные инфекции (бактериальной и вирусной этиологии) в составе комплексной терапии
- нарушения стула: хронические запоры, диарея (у детей до 3-х лет только по назначению врача)
- диарея путешественников
- диспептический синдром при нарушении режима питания, диеты (отрыжка, тошнота, рвота, метеоризм, боли в животе)

Способ применения и дозы
Капсулы принимают с небольшим количеством воды во время еды. Если ребенок не может проглотить целую капсулу, ее необходимо вскрыть и смешать содержимое с небольшим количеством жидкости (чай, сок, подсахаренная вода).
Детям с первого дня жизни до 2 лет рекомендуется принимать по 1 капсуле 3 раза в день запивая небольшим количеством жидкости. Детям с 2 до 12 лет рекомендуется принимать по 1-2 капсуле 3 раза в день, запивая небольшим количеством жидкости.
Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется по 2 капсулы 3 раза в день, запивая небольшим количеством жидкости.
Курс лечения при дисбактериозе составляет 10-21 день. Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма.
Курс лечения при острых кишечных инфекциях, диареи и диспептическом синдроме составляет 5-7 дней.
Если состояние пациента после двух дней принятия капсул не улучшается, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания
- повышенная чувствительность (непереносимость) к любому из компонентов препарата
- непереносимость молочных продуктов

Беременность и период лактации
Во время беременности и лактации использование лекарственного средства не противопоказано. Однако решение о назначении препарата принимает лечащий врач.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта

РК-ЛС-5-004015 от 23.05.2011
Разрешение №3544 от 28.06.2012г.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции
Филиал «Новартис Фарма Сервисс АГ»
г. Алматы, ул. Жамбаева, 155А

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

