

ПРЕСТАНС®

ПЕРИНДОПРИЛА АРГИНИН + АМЛОДИПИНА БЕСИЛАТ

1 ТАБЛЕТКА В ДЕНЬ



Фиксированная комбинация в 4 дозах для лечения АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ и ИБС

Лекарственная форма: Таблетки для приема внутрь 5мг/5мг, 10мг/5мг, 5мг/10мг, 10мг/10мг

Показания к применению: артериальная гипертензия, стабильная ишемическая болезнь сердца.

Способ применения и дозы:

Взрослым: по 1 таблетке в день, желательно утром перед едой. Максимальная разовая и суточная доза - 1 таблетка. При необходимости рекомендуется индивидуальное титрование дозы Престанса® или замена свободной комбинацией. Для пациентов с клиренсом креатинина <60мл/мин рекомендуется титрование дозы отдельных компонентов. Длительность терапии устанавливается врачом индивидуально.

Побочные действия: Часто: сонливость, головокружение, головная боль, парестезии, покраснение лица, гипотензия, тахикардия, боли в области сердца, нарушения зрения, шум в ушах, сухой кашель, одышка, изменение вкуса, сухость во рту, тошнота, рвота, боль в животе, нарушения пищеварения, диарея или запор, крапивница, кожный зуд, сыпь, мышечные судороги, периферические отеки, чувство усталости, астения, недомогание. Нечасто: бессонница, тремор, временная потеря сознания, бронхоспазм, нарушение функции почек, артралгии, миалгии, ангионевротический отек, импотенция, гинекомастия. Редко: повышение уровня билирубина и печеночных ферментов в сыворотке крови. Очень редко: спутанность сознания, аритмия, ИМ и инсульт; гастрит, гепатит, панкреатит, острая почечная недостаточность, лейкопения, отек Квинке, эритема.

Противопоказания: гиперчувствительность к периндоприлу, амлодипину, другим ингибиторам АПФ, производным дигидропиридина и другим компонентам препарата, ангионевротический отек на фоне предыдущей терапии ингибиторами АПФ в анамнезе, наследственный или идиопатический ангионевротический отек, выраженная гипотензия, шок, в т.ч. кардиогенный, обструкция выходного тракта левого желудочка (например, значительный стеноз аорты), нестабильная стенокардия (за исключением стенокардии Принцметала), сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда (в течение первых 28 дней), беременность и период лактации.

Лекарственные взаимодействия: При сопутствующем применении с диуретиками из-за риска гипонатриемии, препараты должны использоваться с осторожностью и под контролем калия в сыворотке и ЭКГ. Сочетанный прием периндоприла и препаратов лития не рекомендуется. НПВС и ингибиторы АПФ оказывают аддитив-

ный эффект на повышение уровня калия в плазме крови. Совместный прием с противодиабетическими препаратами (инсулины, пероральные гипогликемические препараты) может привести к усилению гипогликемического эффекта. У пациентов, принимающих диуретические препараты, особенно у пациентов со снижением ОЦК и/или электролитными нарушениями, после начала терапии ингибитором АПФ может наблюдаться выраженное снижение АД. Симпатомиметические препараты могут снижать гипотензивный эффект ингибиторов АПФ. Необходима осторожность при назначении β-блокаторов с Престансом®. Одновременный прием Престанса® с гипотензивными препаратами других групп, вазодилататорами, нитроглицерином, другими нитратами может привести к усилению гипотензивного эффекта. Кортикостероиды и тетракозактид уменьшают гипотензивное действие Престанса®. Комбинированный прием с трициклическими антидепрессантами, антипсихотическими препаратами, анестезирующими препаратами и α-блокаторами может привести к усилению гипотензивного эффекта и повышению риска развития ортостатической гипотензии.

Особые указания: С осторожностью назначать препарат пациентам с почечной недостаточностью, нарушениями функции печени, с аллергическими заболеваниями, с системной красной волчанкой, склеродермией. Необходимо регулярно проводить мониторинг уровня гликемии у пациентов, принимающих пероральные сахароснижающие препараты и инсулин. Амлодипин с осторожностью назначают при сердечной недостаточности, в связи с возможным риском развития отека легких.

Использование в педиатрии

Эффективность и безопасность применения Престанса® в детском и подростковом возрасте (до 18 лет) изучена недостаточно, в связи с чем назначение препарата данной категории пациентов не рекомендуется.

Особенности влияния на способность к управлению автотранспортом и потенциально опасными механизмами
Следует соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и работе с потенциально опасными механизмами в связи с возможным развитием индивидуальных реакций, связанных со снижением АД, особенно на начальном этапе лечения или при комбинированной терапии с гипотензивными препаратами.

Условия отпуска из аптек: по рецепту врача

Производитель: Servier (Ireland) Industries Ltd, Ирландия.

Держатель лицензии на реализацию: Les Laboratoires Servier, Франция

Дополнительная информация может быть получена по адресу:

Представительство Ле Лаборатуар Сервье в РК

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, бизнес-центр «Нурлы-Тау», корпус 16, офис 605.606

Тел: +7 (727) 311-10-16, 311-10-34/35/36; Факс: +7 (727) 311-10-17; www.servier.com



ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ!

Человек и Лекарство – Казахстан

Научно-практический тематический журнал


1(17), 2013

Серик БЕКБОСЫНОВ:
реалии и перспективы кардиохирургии в Казахстане

Рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC) по диагностике и лечению ОСН и ХСН

Лечение артериальной гипертензии. Клинический разбор

Галымжан ТОГИЗБАЕВ:
ключевые приоритеты Послания Президента
Фармакоэкономические аспекты лечения АГ



№1 (17), 2013


Кардиология
Ревматология

Человек и Лекарство – Казахстан

Разрешение № 2599 от 22.07.2010 г.

РК-ЛС-5-№015460 от 29.01.10 г.
РК-ЛС-5-№015461 от 29.01.10 г.

РК-ЛС-5-№015458 от 29.01.10 г.
РК-ЛС-5-№015459 от 29.01.10 г.



Тиотриазолин – поддержка при ишемической болезни сердца и хронических гепатитах

Показания к применению

В составе комплексной терапии:
- ишемическая болезнь сердца: стенокардия, инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз;
- сердечная аритмия;
- хронические гепатиты различной этиологии (в т.ч. алкогольный гепатит);
- цирроз печени различной этиологии.

Способ применения и дозы:

Раствор для инъекций

Взрослым при остром инфаркте миокарда, хроническом гепатите с выраженной активностью процесса Тиотриазолин в первые 5 дней вводят внутримышечно по 2 мл 2,5 % раствора 2-3 раза в день (2-3 раза по 50 мг), или внутривенно медленно, со скоростью 2 мл/мин струйно по 4 мл 2,5 % раствора (100 мг) 1 раз в день, или капельно со скоростью 20-30 капель в минуту (1 ампулу 2,5 % раствора разводят в 150-250 мл физиологического раствора). С шестого по двадцатый день терапии назначают Тиотриазолин в таблетках (по 100-200 мг 3 раза в день).

При стенокардии напряжения и покоя и постинфарктном кардиосклерозе, хроническом гепатите минимальной и умеренной степени активности, Тиотриазолин вводят внутримышечно по 1 мл 2,5 % раствора 3 раза в день. Курс лечения - 20-30 дней.

Таблетки

При заболеваниях печени, при стенокардии напряжения и покоя, инфаркте миокарда, постинфарктном кардиосклерозе назначают по 1-2 таблетки 3-4 раза в день на протяжении 20-30 дней. Максимальная разовая доза 0,2 г (2 таблетки), максимальная суточная доза 0,6 г (6 таблеток). При нарушении сердечного ритма - по 1-2 таблетки внутрь или под язык 3 раза в сутки. Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально в зависимости от тяжести и особенностей течения заболевания.

Побочные действия

- аллергические реакции: зуд, гиперемия кожи, кожная сыпь (уртикария, папулезная, мелкоочаговая, пятнистая).
Редко:
- общая слабость, головокружение, шум в ушах;
- тахикардия;
- сухость во рту, тошнота, рвота, вздутие живота.
В единичных случаях:
- крапивница, ангионевротический отек и анафилактический шок;
- артериальная гипертензия;
- одышка и одурение.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- острая почечная недостаточность.

- беременность и период лактации;
- детский возраст до 12 лет.

Лекарственные взаимодействия

Не установлены.

Особые указания

Тиотриазолин, как кардиопротекторный препарат, можно применять в комбинации с базисными средствами терапии ишемической болезни сердца. Как гепатопротекторное средство может сочетаться с назначением традиционных методов лечения гепатитов соответствующей этиологии. Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами не изучались.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций, 2,5 % 4 мл №10 ампул.
Таблетки 0,1 г №50.

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

РК - АС - 5 №016847 от 26 ноября 2010 года.
РК - АС - 5 №015842 от 21 апреля 2010 года.

Разрешение

№3406 от 31.05.2012 до 21.04.2015

Ближе к людям

