

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

НОРМОБАКТ JUNIOR

**Вкус шоколадки
и животик в порядке!**



- Восстанавливает равновесие микрофлоры кишечника после антибактериальной терапии
- Продлевает жизнь “полезных” бактерий, корректирует дисбактериоз
- Устраняет пищевую аллергию в комплексной терапии
- Укрепляет иммунитет
- Удобная форма выпуска – 1–2 медвежонка в сутки.
Детям с 3-х лет. Курс лечения 10-14 дней

Медвежата
со вкусом белого
шоколада
таблетки

**ПРОБИОТИК + ПРЕБИОТИК
КАК ЧАСЫ РАБОТАЕТ ЖИВОТИК**

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)
АО «Химфарм», г.Шымкент, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ул. Рашидова б/н, тел./факс: 8 7252 561342, 560882, e-mail: standart@santo.kz

Человек и Лекарство – Казахстан

6 (22), 2013

Научно-практический
тематический журнал

**Школа гепатологов:
цирроз печени
и его осложнения**


**Алгоритм подбора
противохеликобактерной
терапии**

**Европейский консенсус
по лечению болезни
Крона**

**Клуб гастроэнтерологов:
панкреатит – новое
в лечении**

**Внепищеводные
проявления ГЭРБ**

**Исследования при
заболеваниях кишечника:
когда, почему, как?**



№6 (22), 2013

Гастроэнтерология
Гепатология

...двойное действие = гармоничный эффект



Блокада
D2 рецепторов

Блокада
холинэстеразы

Быстрый эффект в лечении симптомов,
обусловленных снижением моторики ЖКТ
(вздутие живота, чувство быстрого насыщения,
тошнота, рвота и т.д.)

Показания к применению

- вздутие живота
- чувство быстрого насыщения
- боль или дискомфорт в верхней половине живота, не связанные с язвенной болезнью желудка или другой органической патологией
- анорексия
- изжога
- тошнота
- рвота

Способ применения и дозы

Доза для взрослых — по 50 мг (1 таблетка) 3 раза/сут до еды. Рекомендуемая суточная доза составляет 150 мг. Указанная доза может быть снижена с учетом возраста больного, в зависимости от тяжести заболевания. Доза и длительность лечения зависит от клинического состояния пациента.


Противопоказания

- беременность и период лактации
- детский возраст до 16 лет

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Перед назначением и применением
изучите инструкцию



Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5-№016714 от 18.10.2010
Разрешение на рекламу № 3423 от 24.05.2012



Потуши изжогу мягко!



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Изжога и кислая отрыжка у взрослых и детей с 15-летнего возраста; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; острый гастроудоденит; хронический гастроудоденит с нормальной или повышенной секреторной функцией в фазе обострения; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; рефлюкс-эзофагит; диспептические явления (и их профилактика), возникающие в результате применения некоторых лекарственных средств (нестероидные противовоспалительные средства, кортикостероиды и др.); дискомфорт или боли в эпигастрии, изжога, отрыжка с кислым вкусом после погрешностей в диете, избыточного курения и употребления алкоголя, кофе и т.п.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Маалокс мини

Предназначен для взрослых и детей старше 15 лет:

- 1-2 мини-пакета (1 доза) при появлении изжоги и кислотной регургитации
- максимальное количество доз в сутки: 6 доз
- принимать в день не более 12 мини-пакетов.

Таблетки маалокс без сахара

Дети с 15-летнего возраста и взрослые: по 1-2 таблетки рассасывать или разжевывать при изжоге и кислой отрыжке. Не следует принимать более 12 таблеток в день. При сохранении симптомов после 10 дней лечения Маалоксом или ухудшения их, необходимо выяснить причину и пересмотреть лечение.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Частота неизвестна. Нарушения транзита желудочно-кишечного тракта (понос или запор); гипофосфатемия после продолжительного применения или после высоких доз препарата из-за содержания алюминия в этом препарате.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата; тяжелая почечная недостаточность, так как препарат содержит магний (клиренс креатинина < 30 мл/мин/1,73 м²); непереносимость фруктозы из-за наличия в препарате сорбитола.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Беременность и период лактации. Во время беременности препарат можно применять только в случае необходимости. Возможность применения препарата при беременности врач решает индивидуально. Во время лечения можно продолжать кормление грудью. Использование в педиатрии. Препарат не применяется у детей до 15 лет.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ



РК-ЛС-5-№016714 от 18.10.2010
РК-ЛС-5-№017882 от 06.05.2011
Разрешение №3355 от 09.04.2012

ТОО "Санofi-Авентис Казахстан", 050016, г. Алматы, ул. Кунаева, 216
Тел.: 8(727) 244-50-96, Факс: 8(727) 258-25-96
www.sanofi-aventis.com

