

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

Нормобакт JUNIOR

**Вкус шоколадки
и животик в порядке!**



- Восстанавливает равновесие микрофлоры кишечника после антибактериальной терапии
- Продлевает жизнь "полезных" бактерий, корректирует дисбактериоз
- Устраняет пищевую аллергию в комплексной терапии
- Укрепляет иммунитет
- Удобная форма выпуска – 1–2 медвежонка в сутки.
Детям с 3-х лет. Курс лечения 10-14 дней

Медвежата
со вкусом белого
шоколада
таблетки

**ПРОБИОТИК + ПРЕБИОТИК
КАК ЧАСЫ РАБОТАЕТ ЖИВОТИК**

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара):
АО «Химфарм», г.Шымкент, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ул. Рашидова б/н, тел./факс: 8 7252 561342, 560882, e-mail: standart@santo.kz

Человек и Лекарство – Казахстан

7(23) 2013

Человек и Лекарство – Казахстан

Научно-практический
тематический журнал

Педиатрические
аспекты клинической
фармакологии

Лечение болезни Гоше:
клинический пример

Рекомендации
Американской
академии педиатрии

О безопасности вакцин
против ВПЧ-инфекции

Клуб педиатров: детская
гастроэнтерология

Новые возможности
в диагностике
муковисцидоза



№7 (23), 2013

Педиатрия

ИНСПИРОН

УТВЕРЖДЕНА

Приказом председателя Комитета
фармацевтического контроля
Министерства Здравоохранения
Республики Казахстан
от 15.08.2012 г.
№614

Торговое название

Инспирон

Международное
непатентованное название

Фенспирид

Лекарственная форма

Сироп 2 мг/мл, 150 мл

Состав

5 мл сиропа содержат активное вещество – фенспирида гидрохлорид, в пересчете на сухое вещество 10 мг; вспомогательные вещества: метилпарагидроксibenзоат (Е 218), пропилпарагидроксibenзоат (Е 216), калия сорбат, аромат мед-липа, корня солодки экстракт, ванилин, глицерин, натрия сахарин, сахар, вода очищенная.

Описание

Бесцветная или желтоватого цвета жидкость со специфическим запахом.
Допускается легкая опалесценция.

Фармакотерапевтическая
группа

Другие препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для системного использования.
Код АТХ R03D X03

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Максимальная концентрация в плазме крови достигается, в среднем, через 2,3-2,5 часа (граница колебания 0,5-8 часов). Период полувыведения – 12 часов. Экскретируется из организма преимущественно с мочой.

Фармакодинамика

Инспирон проявляет бронходилатирующие и противовоспалительные свойства. Фенспирид: блокирует H1-гистаминовые рецепторы, оказывает антигистаминное, спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру бронхов и предотвращает развитие отека, уменьшает выделение слизи из носа и количество бронхиального секрета; оказывает противовоспалительное действие, что обусловлено торможением образования и секреции факторов воспаления (цитокинов, производных арахидоновой кислоты, простагландинов, лейкотриенов, тромбоксана, свободных радикалов); ингибирует β₂-адренорецепторы, которые стимулируют секрецию вязкой слизи.

Показания к применению

- лечение острых и хронических воспалительных процессов ЛОР-органов и дыхательных путей (отит, синусит, ринит, ринофарингит, трахеит, ринотрахеобронхит, бронхит), в составе комплексной терапии бронхиальной астмы
- сезонный и круглогодичный аллергический ринит и другие проявления аллергии со стороны респираторной системы и ЛОР-органов
- корь, грипп
- симптоматическое лечение коклюша.

Способ применения и дозы

Для перорального применения. Применяют перед приемом пищи, предварительно взболтав содержимое флакона. Суточную дозу препарата следует разделить на 2-3 приема.

Детям в возрасте от 2-х лет до 14 лет рекомендованная суточная доза составляет 4 мг/кг массы тела. Препарат можно добавлять в бутылочку с детским питанием.

Рекомендованная суточная доза для детей с массой тела до 10 кг – 10-20 мл сиропа (2-4 чайные ложки), для детей с массой тела 10-45 кг – 30-90 мл сиропа (2-6 столовых ложек).

Для взрослых и детей старше 14 лет целесообразным является применение таблетированных лекарственных средств фенспирида.

Продолжительность лечения определяется врачом и зависит от показаний для применения и протекания заболевания. Минимальный курс лечения острых состояний – 7-10 дней, хронических состояний – 2-6 месяцев.

Побочные действия

Обычно Инспирон хорошо переносится. Возможные побочные реакции:

- расстройства пищеварения, тошнота, рвота, боль в желудке
- очень редко - эритема, сыпь, крапивница, фиксированная пигментная эритема, отек Квинке
- в единичных случаях - синусовая тахикардия, которая исчезает при снижении дозы
- сонливость.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к фенспирида гидрохлориду или к другим компонентам препарата
- врожденная непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы, дефицит сахарозы
- беременность, период кормления грудью
- детский возраст до 2-х лет.

Лекарственные
взаимодействия

Не рекомендуется комбинировать с седативными препаратами и алкоголем.

Особые указания

В состав препарата входит сахар (3 г в одной чайной ложке), поэтому необходимо придерживаться осторожности при применении Инспирона у пациентов, которые находятся на диете с низким содержанием



сахара, а также при наличии сахарного диабета. Лечение препаратом не заменяет антибиотикотерапию. Перед употреблением взболтать.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Поскольку препарат может вызывать сонливость, следует проявлять осторожность при управлении автотранспортом и в работе с другими механизмами.

Передозировка

Симптомы: возможны сонливость, возбуждение, тошнота, рвота, синусовая тахикардия.

Лечение: необходимо промыть желудок, проводить мониторинг электрокардиограммы. Симптоматическая терапия.

Форма выпуска и упаковка

По 150 мл во флаконы стеклянные, закрытые колпачками пластиковыми с контролем первого вскрытия и защитой от детей.

По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках и ложкой мерной укладывают в пачку из картона.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.

Срок хранения

2 года. После вскрытия хранить не более 30 суток.

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Производитель

АО «Галичфарм» Украина, 79024, г. Львов, ул. Опришковская, 6/8

Владелец регистрационного
удостоверения

АО «Галичфарм», Украина, 79024, г. Львов, ул. Опришковская, 6/8

Боботик

симетикон

Чтобы не болел ЖИВОТИК



8
капель
после
еды

Показания:

- усиленное газообразование и накопление газов
- диспепсия
- в качестве пеногасителя при острых отравлениях моющими средствами

Способ применения и дозы: применяется после еды и перед сном:

- дети от 28 дня жизни до 2 лет - по 8 капель 4 раза в сутки,
- дети от 2 до 6 лет - по 14 капель 4 раза в сутки,
- дети старше 6 лет и взрослые - по 16 капель 4 раза в сутки

Противопоказания:

повышенная чувствительность к симетикону и /или другим компонентам препарата, кишечная непроходимость, обструктивные заболевания ЖКТ

Условия отпуска из аптек: Без рецепта

Производитель: Медана Фарма АО 98-200 Серадз, ул. В. Локетка 10, Польша

Перед применением и назначением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5-№015656 от 15.02.2010 Разрешение №3306 от 17.02.2012 г.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)
Представительство ФЗ "Польфарма" СА в РК,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби 15, бизнес-центр «Нурлы Тау» 4В, офис 1201, тел./факс: + 7 (727) 3111-289

