


7.5 **утром и** 7.5 **вечером**



2 ПОКАЗАНИЯ ИБС и ХСН

**Пациентам с ХСН и
сохранным синусовым
ритмом, ЧСС>75 уд/мин**

Пациентам с недостаточным контролем стенокардии на фоне приема бета-блокатора



Показатели представлены

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ!

Человек и Лекарство – Казахстан

9(25), 2013

Научно-практический тематический журнал

АГИУВ подводит итоги 50-летнего пути и строит планы на будущее

Ревматологов нам надо готовить массовым тиражом

Третье универсальное определение инфаркта миокарда

Новая эра антикоагулянтной терапии

Международные рекомендаций для пациентов «Лечение ревматоидного артрита до достижения цели (Treat to Target)»

От интенсивной модернизации к конструктивной реализации!

Европейские рекомендации по сердечной недостаточности



№9 (25), 2013

Кардиология
Ревматология

Человек и Лекарство – Казахстан

VI Международный конгресс – 2013

ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО – КАЗАХСТАН



30-31 октября г. Алматы,
Дом приемов «Бакшасарай»
1 ноября г. Шымкент,
Театр оперы и балета

**Ведущие ученые
Казахстана,
России, Украины**

Направления Конгресса:

кардиология, пульмонология, антибиотикотерапия,
гастроэнтерология, неврология, эндокринология,
педиатрия, урология

Мастер-классы, круглые столы, симпозиумы

Генеральный спонсор

SANOFI

Генеральные информационные партнеры

Информационные партнеры

Человек и Лекарство –
Научно-популярный
тематический журнал **Казахстан**

**КАЗАХСТАНСКИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК**

КМЖ
Казахстанский медицинский журнал

Издательство
Здравоохранение
Казахстана

**ГЛАВНЫЙ
ВРАЧ**

МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КАЗАХСТАНА

**ФАРМАЦИЯ
КАЗАХСТАНА**

Фармацевтическое
обозрение **Казахстана**
www.pharmreview.kz

По вопросам участия обращаться по тел: +7(727)327 72 45 моб: +7 (701)724 08 18

e-mail: masters.trade@mail.ru www.chil.kz



Тиотриазолин – поддержка при ишемической болезни сердца и хронических гепатитах



Показания к применению

В составе комплексной терапии:
- ишемическая болезнь сердца: стенокардия,
инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз;
- сердечная аритмия;
- хронические гепатиты различной этиологии (в т.ч.
алкогольный гепатит);
- цирроз печени различной этиологии.

Способ применения и дозы:

Раствор для инъекций
Взрослым при остром инфаркте миокарда,
хроническом гепатите с выраженной активностью
процесса Тиотриазолин в первые 5 дней вводят
внутримышечно по 2 мл 2.5 % раствора 2-3 раза в день
(2-3 раза по 50 мг), или внутривенно медленно, со
скоростью 2 мл/мин струей по 4 мл 2.5 % раствора
(100 мг) 1 раз в день, или капельно со скоростью 20-30
капель в минуту (1 ампулу 2.5 % раствора разводят в
150-250 мл физиологического раствора). С шестого
по двадцатый день терапии назначают Тиотриазолин в
таблетках (по 100-200 мг 3 раза в день).
При стенокардии напряжения и покоя и
постинфарктном кардиосклерозе, хроническом
гепатите минимальной и умеренной степени
активности, Тиотриазолин вводят внутримышечно по 1
мл 2.5 % раствора 3 раза в день. Курс лечения – 20-30
дней.

Таблетки

При заболеваниях печени, при стенокардии
напряжения и покоя, инфаркте миокарда,
постинфарктном кардиосклерозе назначают – по 1-2
таблетки 3 – 4 раза в день на протяжении 20 – 30 дней.
Максимальная разовая доза 0,2 г (2 таблетки),
максимальная суточная доза 0,6 г (6 таблеток).
При нарушении сердечного ритма – по 1 – 2 таблетки
внутрь или под язык 3 раза в сутки.
Длительность курса лечения определяется врачом
индивидуально в зависимости от тяжести и
особенностей течения заболевания.

Побочные действия

- аллергические реакции: зуд, гиперемия кожи, кожная
сыпь (уртикария, папулезная макулоэритема, пеллида);
Редко
- общая слабость, головокружение, шум в ушах
- тахикардия
- сухость во рту, тошнота, рвота, вздутие живота
В единичных случаях
- крапивница, ангионевротический отек и
анафилактический шок
- артериальная гипертензия
- одышка и удушье

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам
препарата
- острая почечная недостаточность

- беременность и период лактации
- детский возраст до 12 лет

Лекарственные взаимодействия

Не установлены.
Особые указания
Тиотриазолин, как кардиопротекторный препарат,
можно применять в комбинации с базисными
средствами терапии ишемической болезни сердца.
Как гепатопротекторное средство может сочетаться с
назначением традиционных методов лечения
гепатитов соответствующей этиологии.
Особенности влияния лекарственного средства на
способность управлять транспортным средством или
потенциально опасными механизмами
Не изучались.

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Лекарственная форма

Раствор для инъекций, 2.5 % 4 мл №10 ампул

Таблетки 0,1 г №50

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

РК – АС – 5 №016847 от 26 ноября 2010 года

РК – АС – 5 №015842 от 21 апреля 2010 года

Разрешение

№3406 от 31.05.2012 до 21.04.2015

Ближе к людям

ARTERIUM