

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства СПИРИВА®

Торговое название СПИРИВА®

Международное непатентованное название

Тиотропия бромид

Фармакотерапевтическая группа

Другие ингаляционные препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Холиноблокаторы. Код АТС R03BB04

Состав. Одна капсула содержит активное вещество - тиотропия 18 мкг (равное 22,5 мкг тиотропия бромид моногидрата), вспомогательное вещество - моногидрат лактозы (содержит молочный протеин).

Показания к применению. Лечение и профилактика ХОБЛ, в том числе, хронического бронхита и эмфиземы легких, сопровождающиеся одышкой

Способ применения и дозы. Ингаляционно. При использовании СПИРИВЫ в виде ингаляций с помощью ингалятора ХандиХалер рекомендуется принимать одну капсулу в сутки в одно и то же время. Капсулы с препаратом глотать нельзя! Пожилые больные должны принимать СПИРИВУ в рекомендуемых дозах. Пациенты с нарушенной функцией почек могут использовать СПИРИВУ в рекомендуемых дозах. Однако необходимо тщательное наблюдение за больными с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью получающими СПИРИВУ (как и в случае с другими препаратами, экскретирующимися в основном почками). Пациенты с печеночной недостаточностью могут принимать СПИРИВУ в рекомендуемых дозах. Нет данных о применении СПИРИВЫ у новорожденных и детей, не рекомендуется применение препарата в данной возрастной группе.

Побочные действия. Сухость во рту (обычно умеренная), запор, обезвоживание, кандидоз орофарингеальный, гастроэзофагеальный рефлюкс, дисфония, бронхоспазм, кашель, носовое кровотечение, сердцебиение, тахикардия, затрудненное мочеиспускание и задержка мочеиспускания (у мужчин с предрасполагающими факторами), инфекции мочевого тракта, дизурия, сыпь, крапивница, зуд, сухость кожи, гиперчувствительность (включая реакции немедленного типа), головокружение,

бессонница, нечеткое зрение, повышение внутриглазного давления, воспаление суставов. В единичных случаях - кишечная непроходимость, включая паралитический илеус, дисфагия, стоматит, гингивит, воспаление языка, ларингит, фарингит, синусит, суправентрикулярная тахикардия, мерцательная аритмия, ангионевротический отек, инфекции и язва кожи, глаукома. Большинство из приведенных выше побочных реакций могут быть связаны с антихолинергическим действием СПИРИВЫ.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к атропину или его производным (например, ипратропию или окситропию) или к другим компонентам препарата (см. раздел «Состав»). I-й триместр беременности. Детский и подростковый возраст до 18 лет

Особые указания. СПИРИВА – как бронходилататор, применяемый раз в сутки для поддерживающего лечения, не должна использоваться в качестве начальной терапии при острых приступах бронхоспазма, т.е. в неотложных случаях. После ингаляции порошка СПИРИВЫ могут развиваться немедленные реакции повышенной чувствительности. Ингаляция препарата может привести к бронхоспазму. Больных с умеренной или выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤ 50 мл/мин) при приеме СПИРИВЫ следует тщательно наблюдать, как это необходимо и в других случаях назначения лекарств, экскретирующихся преимущественно почками. Пациенты должны быть ознакомлены с правилами использования капсул СПИРИВЫ. Не следует допускать попадания порошка в глаза. Боль в глазу или дискомфорт, нечеткое зрение, зрительные ореолы в сочетании с покраснением глаз, конъюнктивальным застоем и отеком роговицы могут свидетельствовать об остром приступе закрытоугольной глаукомы. При развитии любой комбинации этих симптомов следует немедленно обратиться к специалисту. Применение препаратов, вызывающих миоз, не является эффективным способом лечения в данном случае. СПИРИВУ не следует применять чаще, чем раз в день. Капсулы СПИРИВЫ должны применяться только с прибором ХандиХалер!

С осторожностью. Закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстатель-

ной железы, обструкция шейки мочевого пузыря. Беременность и лактация СПИРИВУ следует применять беременным (II-й и III-й триместр беременности) и кормящим женщинам, только в том случае, если ожидаемая польза превышает любой возможный риск для плода или новорожденного. Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять автотранспортом или другими потенциально опасными механизмами. Не проводилось исследований по изучению такого влияния. Учитывая случаи головокружения и нечеткости зрения при приеме препарата, следует соблюдать осторожность.

Лекарственные взаимодействия. Сочетанное применение СПИРИВЫ с другими антихолинергическими средствами не рекомендуется. Возможно применение тиотропия в комбинации с другими препаратами, обычно используемыми для лечения ХОБЛ: симпатомиметиками, метилксантинами, пероральными и ингаляционными глюкокортикостероидами.

Передозировка. Симптомы – при применении высоких доз возможны проявления антихолинергического действия: сухость во рту, нарушения аккомодации, увеличение частоты сердечных сокращений. Лечение – симптоматическое. Однако системные антихолинергические побочные эффекты не выявлялись после однократной ингаляционной дозы до 282 мкг тиотропия. Билатеральный конъюнктивит в сочетании с сухостью во рту наблюдались после повторного приема однократной суточной дозы 141 мкг, которые исчезали при продолжении лечения. У пациентов с ХОБЛ, получавших максимально 36 мкг препарата более 4 недель, сухость во рту была единственным побочным эффектом. Острая интоксикация, связанная со случайным приемом капсул внутрь, маловероятна в связи с низкой биодоступностью препарата.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25°

Условия отпуска из аптеки: по рецепту

Перед применением и назначением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Человек и Лекарство –

Научно-практический тематический журнал

3(7), 2012

От пульмонологии до респираторной медицины

Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике

Хроническое обструктивное заболевание легких: не так все безнадежно

Синдром обструктивного апноэ сна

Терапия сезонного аллергического ринита у детей и подростков

Новая редакция GOLD. Значение для клинициста

Казахстан



№3 (7), 2012

Пульмонология
Аллергология

За дополнительной информацией
обращаться: «Представительство
«Берингер Ингельхайм Фарма Гес мбХ»
в Республике Казахстан»

Адрес: Республика Казахстан,
050008 г. Алматы, пр. Абая, 52
Телефон: +7 (727) 250-00-77
факс: +7 (727) 244-51-77



Человек и Лекарство – Казахстан

ГЕЛИСАЛ

экстракт плюща обыкновенного

Чтобы
кашель
не мешал



ПОКАЗАНИЯ:

Комплексная терапия инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей:

острый и хронический бронхит

бронхоспазм

затрудненное отделение мокроты и/или патологическое

увеличение ее вязкости

кашель в том числе сухой

Способ применения и дозы:

взрослым и детям старше 10 лет — по 5 мл (1 мерная ложечка) 3 раза в сутки; **детям 5–10 лет** — по 2,5 мл (1/2 мерной ложечки) 3 раза в сутки; **детям с 1–5 лет** — по 2,5 мл (1/2 мерной ложечки) 2 раза в сутки. **Детям до 1 года** можно применять после консультации с врачом в соответствии с его рекомендациями. Не следует превышать рекомендуемую дозу. Продолжительность лечения 7 дней. Рекомендуется продолжение лечения в течение 2–3 дней после исчезновения симптомов заболевания.

Побочные действия и реакции: тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции.

Противопоказания: повышенная чувствительность к экстракту из листьев плюща или к компонентам препарата; наследственная непереносимость фруктозы.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель: Медана Фарма АО 98-200 Серадз, ул. В. Локетка 10, ПОЛЬША

Перед применением и назначением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Регистрационное удостоверение: РК-ЛС-5-№17161 от 15.12.2010 Разрешение №3305 от 17.02.2012 г.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара):
Представительство ФЗ «Польфарма» СА в РК,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби 15, бизнес-центр «Нурлы Тау» 4В, офис 1201, тел./факс: +7 (727) 3111-289



ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ГРИППА И ПРОСТУДЫ



АМИЗОН
Время не болеть!



Для лечения и профилактики гриппа и простуды можно использовать **“Амизон”** (таблетки покрытые оболочкой 0,25 г №10 и №20). Под его действием вирусы, которые чаще всего и являются причиной сезонных эпидемий, теряют способность присоединяться к клеткам-мишеням, поэтому инфекция не распространяется по организму. Также **“Амизон”** стимулирует выработку в крови интерферона, который защищает организм человека от вирусов. После приема **“Амизона”** уровень интерферона в крови возрастает в 3–4 раза!

“Амизон” повышает устойчивость организма к вирусным инфекциям за счет влияния на все звенья иммунитета (клеточный иммунитет, активность фагоцитоза, уровень лизоцима). Все эти факторы ускоряют процесс обезвреживания вируса и его выведение из организма больного, предупреждают развитие бактериальных осложнений (отит, бронхит, пневмония) и частоту повторных заболеваний. Иммуномодулирующее действие **“Амизона”** позволяет использовать его для профилактики гриппа в очагах инфекции во время эпидемии.

“Амизон”, кроме непосредственного влияния на вирус, еще оказывает жаропонижающее, противовоспалительное и обезболивающее действия. **“Амизон” облегчает основные симптомы гриппа и воздействует на причину заболевания!** Кроме того, **“Амизон”** не оказывает отрицательного влияния на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

При первых признаках болезни обратитесь к врачу! В случае рекомендации начинайте применять **“Амизон”**. С лечебной целью взрослым обычно назначают по 1–2 таблетки 2–4 раза в день в течение 5–7 дней.

Для профилактики гриппа и ОРВИ **“Амизон”** рекомендуется применять:

- взрослым по 1 таблетке в сутки на протяжении 3–5 дней, в дальнейшем по 1 таблетке через день на протяжении 2–3 недель

- детям 12–16 лет по 1 таблетке через день на протяжении 2–3 недель.

Время не болеть!

Побочные действия: ощущение горечи во рту, гиперсаливация, легкий отек слизистой оболочки ротовой полости.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, первый триместр беременности, детский возраст до 6 лет.

Перед применением внимательно изучите инструкцию по медицинскому применению.

Отпускается без рецепта.

РК-ЛС-5 №013808 от 24.04.2009 г.

Разрешение на рекламу № 2859 от 21.02.2011 г.

Производитель: ОАО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

Представительство ОАО «Фармак» в РК: г. Алматы, пр. Абая 157, оф. 5, тел. +7(727) 266 28 31

