



МАГНЕ В₆® ПРЕМИУМ

Показания к применению

Установленный дефицит магния, изолированный или ассоциированный.

Комбинация следующих симптомов может свидетельствовать о дефиците магния:

- нервозность, раздражительность, легкие тревожные состояния, преходящая усталость, небольшие нарушения сна
- признаки тревоги, такие как желудочно-кишечные спазмы или учащенное сердцебиение (без какой-либо патологии со стороны сердца)
- мышечные судороги, ощущение покалывания в мышцах

Способ применения и дозы

Таблетки следует принимать целиком, запивая стаканом воды.

Взрослые: 3-4 таблетки в сутки, разделенные на 2-3 приема, во время еды.

Дети в возрасте старше 6 лет (весом около 20 кг): 10-30 мг/кг/сутки (0,4-1,2 ммоль/кг/сутки), что составляет 2-4 таблетки в сутки, разделенные на 2-3 приема, во время еды.

Лечение следует прекратить после нормализации уровня магния в крови.

Обычно продолжительность лечения составляет один месяц.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к одному из компонентов
- тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин)
- одновременный прием с леводопой

Особые указания

Беременность и период лактации

Магний может применяться при любом сроке беременности только при необходимости по назначению врача.

Каждый компонент магний или витамин В6 индивидуально считается совместимым с лактацией. Принимая во внимание ограниченность доступных данных максимально рекомендуемая доза витамина В6 в период лактации 20 мг/день.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

ТОО «Санofi-авентис Казахстан»
050016, г.Алматы, ул.Кунаева 21Б
тел. +7 (727) 244 50 96,
факс +7 (727) 258 25 96

www.sanofi-aventis.com
www.magneb6.ru

SANOFI



PK-JC-5-Ne004275 от 22.07.2011
KZ.MCP.11.10.01

Человек и Лекарство – Казахстан

4(8), 2012

Научно-практический
тематический журнал

Неврология
большого города

Диабетические
нейропатии: обновленные
рекомендации

Опыт применения
L-Лизина Эсцината
в терапии больных
с шейной радикулопатией

Руководство
Европейской федерации
неврологических
сообществ (EFNS)
по медикаментозной
терапии мигрени

КЛУБ НЕВРОЛОГОВ:
болезнь Паркинсона
и паркинсонические
синдромы



№4 (8), 2012

Неврология
Психиатрия

L-лизина эсцинат

0,1% раствор для инъекций

10 ампул по 5 мл

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОТЕЧНО-БОЛЕВОГО СИНДРОМА



Торговое название

L-Лизина эсцинат
Раствор для инъекций 0,1%, 5 мл

Состав:

1мл раствора содержит
активное вещество - L-Лизина эсцинат (в пересчете на
100% вещество) 1 мг.

Показания к применению

- посттравматические, интра- и послеоперационные отеки любой локализации; отек головного и спинного мозга, в том числе с субарахноидальными и внутричерепными гематомами и смещением срединных структур головного мозга и синдромом отека-набухания
- отеки мягких тканей с вовлечением опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся локальными расстройствами их кровоснабжения и болевым синдромом
- тяжелые нарушения венозного кровообращения нижних конечностей при остром тромбозе

Способ применения и дозы

Суточная доза препарата для взрослых составляет 5-10 мл. 5 - 10 мл препарата разводят в 15 - 50 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций и вводят только внутривенно (внутриартериальное введение не допускается). При состояниях, угрожающих жизни больного, суточную дозу увеличивают до 10 мл дважды в сутки. Максимальная суточная доза для взрослых – 25 мл. Длительность применения препарата составляет 2 - 8 суток, в зависимости от эффективности терапии. У детей разовая доза вводится из расчета: 1-5 лет - 0,22 мг L-Лизина эсцината на кг массы тела 5-10 лет - 0,18 мг L-Лизина эсцината на кг массы тела 10 лет и старше - 0,15 мг L-Лизина эсцината на кг массы тела. Препарат вводят 2 раза в сутки. Продолжительность курса от 2 до 8 дней, в зависимости от состояния больного и эффективности терапии.

Производитель: АО «Галичфарм»

Представительство Корпорации «Артериум» в РК:
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 97, офис 54.
Тел.: 8 (727) 315-82-09/10. Тел. для справок в г. Алматы: 130.

Побочные действия

- аллергические реакции в виде кожной сыпи, крапивницы, ангионевротического отека

Противопоказания

- выраженные нарушения функции почек
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата
- детский возраст до 1 года

Лекарственные взаимодействия

При лечении L-Лизина эсцинатом возможно назначение других лекарственных средств при соответствующих показаниях (противовоспалительных, анальгетиков, антимикробных). Препарат не следует применять одновременно с аминогликозидами, из-за возможности повышения их нефротоксичности. При необходимости одновременного назначения L-Лизина эсцината и антикоагулянтов дозы последних необходимо снижать, (контроль протромбинового индекса). Связывание эсцина с белками плазмы ухудшается при одновременном применении антибиотиков цефалоспоринового ряда, что может повышать концентрацию свободного эсцина в крови с риском развития побочных эффектов последнего.

Особые указания

Данные об опыте применения препарата беременным и в период лактации отсутствуют. Заболевания, при которых применяется препарат, исключают возможность вождения автомобильного транспорта.

Препарат отпускается по рецепту врача.

Перед применением внимательно изучите инструкцию.

Регистрационный номер РК-ЛС-5-№011430 от 23.04.2008 г.

Ближе к людям
ARTERIUM

Ревмоксикам®

Мелоксикам



Разрешение № 170 от 16.06.2008 г.
РК-ЛС-5 № 010194 от 19.09.2007 г.
РК-ЛС-5 № 010193 от 19.09.2007 г.
РК-ЛС-5 № 011649 от 26.05.2008 г.

Переход на новый уровень

Лечение болевого синдрома и воспалительного процесса при артритах, артрозах, остеоартрозах, ревматоидном артрите!

✓ Селективный ингибитор ЦОГ – 2.

✓ Анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.

✓ Минимальный риск развития желудочно-кишечных осложнений.

✓ Удобное применение – 1 раз в день!

✓ Продолжительность действия – 24 часа!

✓ Выбор способа введения: в/м или внутрь

Ревмоксикам показан для лечения:

- воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов (артрозы, остеоартроз)
- ревматоидного артрита
- болезни Бехтерева.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к мелоксикаму и другим НПВС (в том числе салицилатам), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, выраженные нарушения функции печени, почечная недостаточность, период беременности и кормления грудью, детский возраст до 15 лет.

Побочные действия.

- диспепсия, тошнота, рвота, боли в животе, запор, кишечная колика, диарея, эзофагит, стоматит, редко – эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта
- головокружение, головная боль, шум в ушах, сонливость, лабильность настроения, раздражительность
- повышение артериального давления, ощущение сердцебиения, отеки, приливы
- изменение лабораторных показателей функции почек (повышение креатинина и/или мочевины сыворотки крови)
- анемия, лейкопения, тромбоцитопения, снижение гематокрита и уровня гемоглобина в крови
- бронхоспазм, фотосенсибилизация, кожный зуд, сыпь (крапивница) на коже.

Рекомендуемая схема постоперационной терапии

Показания	Путь введения	Доза/сутки	Продолжительность
Воспалительные и дегенеративные заболевания суставов (артрозы, остеоартроз)	В/м, внутрь	15/7.5мг 15мг	3-5 дней 3-4 недели
Ревматоидный артрит	В/м, внутрь	15/7.5мг 15мг	3-5 дней 3-4 недели (до 2 мес.)
Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)	В/м	15мг	3-5 дней



Перед назначением и применением внимательно прочитайте инструкцию! Условия отпуска из аптек. По рецепту.
Производитель: ОАО «Фармак», 04080, Украина, г. Киев, ул. Фрунзе, 63. Представительство ОАО «Фармак» в РК: Алматы, ул. Топи би 291 а Л. оф 74, тел. +8(727) 250 10 29

Фармак