


Энтерожермина®

Споры «*Bacillus Clausii*»

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
НАРУШЕНИЙ МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ КИШЕЧНИКА



Споры устойчивы
к химическим
(желудочный сок)
и физическим
факторам

Возможен прием
во время лечения
антибиотиками

Вырабатывает
витамины,
в частности,
группы «В»

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- лечение и профилактика нарушений микробной флоры кишечника и последующего эндогенного нарушения витаминного баланса
- лечение по восстановлению кишечной микробной флоры, изменённой в ходе лечения антибиотиками или химиотерапевтическими средствами
- острые и хронические желудочно-кишечные расстройства у детей младшего возраста, характерные для интоксикации или нарушений микробной флоры кишечника и нарушений витаминного баланса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Детям в возрасте от 1 месяца до 2 лет: 1-2 флакона (5-10 мл) в день.
Детям от 2 до 12 лет: 1-2 флакона (5-10 мл) в день.
Детям старше 12 лет и взрослым: 2-3 флакона (10-15 мл) в день.
Флаконы назначают с соблюдением регулярных интервалов (3-4 часа). Продолжительность лечения определяется индивидуально врачом и составляет от 6 до 14 дней. Содержимое флаконов принимают без разведения или разводя в воде, молоке, чае, апельсиновом соке.
Перед использованием содержимое флакона необходимо встряхнуть.
Этот препарат предназначен для приема внутрь. Не вводить парентерально и не применять другим способом!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повышенная чувствительность к действующему веществу или какому-либо из ингредиентов препарата.
- детский возраст до 1 месяца

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Возможное наличие видимых включений во флаконах Энтерожермины обусловлено агрегатами спор *Bacillus clausii*, поэтому оно не означает, что препарат претерпел изменения. Встряхивайте флакон перед применением.
Данный препарат не противопоказан для применения при целиакии.

Во время антибиотической терапии препарат следует принимать в перерывах между отдельными дозами антибиотика.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Приём данного лекарственного препарата не противопоказан во время беременности и в период лактации.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Без рецепта.

ТОО «Санofi-Авентис Казахстан»
050016, г. Алматы, ул. Кунаева, 216
Тел.: +7 727 244 50 96, 244 50 97, Факс: +7 727 258 25 96
www.sanofi-aventis.com

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РК-БП-5-№013056 от 05.12.2008 г.
Разрешение №3211 от 08 ноября 2011

Для приема внутрь
Не вводить инъекционно



KZ.ENT.11.10.01

SANOFI

Человек и Лекарство – Казахстан

5(9), 2012

Научно-практический
тематический журнал

Настоящее и будущее
гастроэнтерологии


Рекомендации
Маастрихт-4

Современные возможности
терапии язвенной
болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки

Клуб гастроэнтеролога:
Гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь


Лекарственные поражения
печени при применении
антибактериальных
средств

XIX-я Европейская
Гастроэнтерологическая
неделя (UEGF) в
Стокгольме



№5 (9), 2012

Гастроэнтерология
Гепатология



Нексиум®
эзомепразол

МНН Эзомепразол
Лекарственная форма Таблетки, покрытые оболочкой, 20мг, 40мг

Состав
Одна таблетка содержит: активное вещество - эзомепразол 20мг и 40мг, что соответствует эзомепразола магния тригидрат 22,3мг или 44,5мг

Фармакодинамика
Эзомепразол является S-изомером омепразола. Снижает секрецию кислоты в желудке путем специфического ингибирования протонного насоса в париетальных клетках. Лечение Нексиумом в дозе 20мг 2 раза в сутки в комбинации с соответствующими антибиотиками в течение одной недели приводит к успешной эрадикации *Helicobacter pylori* приблизительно у 90% пациентов. Пациентам с несложившейся язвенной болезнью после недельного эрадикационного курса не требуется последующей монотерапии антисекреторными препаратами для заживления язвы и устранения симптомов.

Показания к применению
• гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированная с *Helicobacter pylori*
• лечение и профилактика язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, связанной с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов
• синдром Золлингера-Эллисона или другие состояния, характеризующиеся патологической гиперсекрецией, в том числе, и идиопатическая гиперсекреция

Способ применения и дозы
Таблетку следует глотать целиком, запивая жидкостью. Таблетки нельзя разжевывать или дробить.

Гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь у взрослых и детей с 12 лет:
• лечение эрозивного рефлюкс-эзофагита: Нексиум по 40мг один раз в сутки в течение 4-х недель. Рекомендуется дополнительный 4-х недельный курс лечения в случаях, когда после первого курса заживление эзофагита не наступает или сохраняются симптомы заболевания.
• длительное поддерживающее лечение после заживления эрозивного рефлюкс-эзофагита для предотвращения рецидива: Нексиум по 20мг один раз в сутки.
• симптоматическое лечение гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни: Нексиум по 20мг один раз в сутки – пациентам без эзофагита. Если после 4-х недель лечения симптомы не исчезают, следует провести дополнительное обследование пациента. После устранения симптомов можно перейти на режим приема препарата «при необходимости», т.е. принимать Нексиум по 20мг один раз в сутки при возобновлении симптомов. Для пациентов, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты и относящихся к группе риска развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, лечение в режиме «при необходимости» не рекомендуется.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у взрослых пациентов:
• лечение язвы двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с *Helicobacter pylori*: Нексиум 20мг (в комбинации с амоксициллином, кларитромицином) два раза в сутки в течение 1 недели.
• профилактика рецидивов пептических язв, ассоциированных с *Helicobacter pylori*: Нексиум 20мг (в комбинации с амоксициллином, кларитромицином) два раза в сутки в течение 1 недели.

Пациенты, длительно принимающие нестероидные противовоспалительные препараты:
• заживление язвы желудка, связанной с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов: Нексиум 20мг или 40мг один раз в сутки. Длительность лечения составляет 4-8 недель.
• профилактика язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, связанной с приемом несте-

роидных противовоспалительных препаратов: Нексиум 20мг или 40мг один раз в сутки. Состояния, связанные с патологической гиперсекрецией, в том числе, синдром Золлингера-Эллисона и идиопатическая гиперсекреция:

- Рекомендуемая начальная доза - Нексиум 40мг два раза в сутки. В дальнейшем доза подбирается индивидуально, длительность лечения определяется клинической картиной заболевания.
- Имеется опыт применения препарата в дозах до 120 мг 2 раза в сутки.

Побочные действия
Часто (>1/100, <1/10): головная боль, тошнота/рвота, боль в животе, метеоризм, диарея, запор. Менее часто (>1/1000, <1/100): дерматит, зуд, сыпь, крапивница, сонливость, бессонница, головокружение, парестезии, сухость во рту, периферические отеки, повышение активности «печеночных» ферментов. Редко (>1/10000, <1/1000): реакции гиперчувствительности (лихорадка, ангионевротический отек, анафилактическая реакция/анафилактический шок, бронхоспазм), нечеткость зрения, гепатит (с желтухой или без), артралгия, миалгия, лейкопения, тромбоцитопения, депрессия, возбуждение, замешательство, недомогание, гипонатриемия, нарушение вкуса, стоматит, кандидоз желудочно-кишечного тракта, алоpecia, фотосенсибилизация, потливость.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к эзомепразолу, замещенным бензимидазолам или другим ингредиентам, входящим в состав препарата, наследственная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция или сахарозо-изомальтазная недостаточность, детский возраст до 12 лет.

Лекарственные взаимодействия
Снижение кислотности желудочного сока на фоне лечения эзомепразолом может привести к изменению абсорбции препаратов, всасывание которых зависит от кислотности среды. Эзомепразол, как антациды и другие препараты, снижающие секрецию кислоты в желудке, может приводить к снижению абсорбции кетоконазола и итраконазола. Не следует назначать эзомепразол совместно с атазанавиром. Эзомепразол ингибирует CYP2C19 - основной фермент, участвующий в его метаболизме. Соответственно, совместное применение эзомепразола с другими препаратами, в метаболизме которых принимает участие CYP2C19, такими как диазепам, циталопрам, имипрамин, кломипрамин, фенитоин и др., может привести к повышению концентраций этих препаратов в плазме, что, в свою очередь, может потребовать снижения дозы. Об этом взаимодействии особенно важно помнить при назначении Нексиума в режиме «по необходимости». При совместном приеме 30 мг эзомепразола и диазепамы, который является субстратом цитохрома CYP2C19, отмечается снижение клиренса диазепамы на 45%. Назначение эзомепразола в дозе 40мг приводило к повышению остаточной концентрации фенитоина у пациентов с эпилепсией на 13%. В связи с этим рекомендуется контролировать концентрации фенитоина в плазме в начале лечения эзомепразолом и при его отмене. Совместный прием варфарина с 40мг эзомепразола не приводит к изменению времени коагуляции у пациентов, длительно принимающих варфарин. Нексиум не вызывает клинически значимых изменений фармакокинетики амоксициллина и хинидина. Исследования по оценке краткосрочного совместного применения эзомепразола и напроксена или рофекоксиба не выявили клинически значимого фармакокинетического взаимодействия.

Условия отпуска из аптек
По рецепту

Производитель
АстраЗенка AB, SE-151 85 Содертаље, Швеция

Перед назначением и применением внимательно прочтите инструкцию по применению.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в представительство компании ЗАО «АстраЗенка Ю Кед Лимитед» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Premium Business Center, ул. Наурызбай батыра, 31, 8 этаж; офисы №83, №84. тел.: +7 727 226-25-30; факс: +7 727 226-25-29

АНТРАЛЬ

Здоровье печени в твоих руках!



- ✓ Восстанавливает клетки и функции печени
- ✓ Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием
- ✓ Нормализует обмен веществ
- ✓ Защищает печень от воздействия токсинов
- ✓ Курс лечения 3-4 недели!

Показания к применению. Острые и хронические гепатиты различной этиологии (вирусные, алкогольные, медикаментозные, токсические). Жировая дистрофия и циррозы печени. Воспалительные заболевания желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы. При резекции желчного пузыря. Профилактика заболеваний печени вследствие вредного воздействия токсинов различной этиологии; алиментарные токсины, лекарственные средства, химиотерапия, лучевая терапия.

Способ применения и дозы. Принимать внутрь через 20-30 минут после еды по 1 таблетке 3 раза в день на протяжении 3-4 недель.

Побочные действия. Редко возможны диспепсические явления.

Противопоказания. Нарушение выделительной функции почек. Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременность и период лактации. Детский возраст до 4 лет. Перед применением внимательно изучите инструкцию.

Отпускается без рецепта врача.
Производитель: ОАО "Фармак", г. Киев, ул. Фрунзе, 63.
Представительство в РК: г. Алматы, пр. Абая 157, оф. 5, тел. +7 (727) 266 28 31
РК-ЛС-5-№015726 от 17.03.2010 г.
Разрешение на рекламу № 3037 от 23.05.2011г.

Спрашивайте в аптеках Вашего города.